

LESIONES PRECURSORAS DEL CÁNCER ANAL


Erene Flores Rodríguez
Servicio de cirugía general y del aparato digestivo.
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo.

 #cirugiavigo

NUESTRO “LATE MOTIV”



50.856 casos de cáncer
de ano en 2020



88% Ligados a VPH (16 Y 18)
a raíz de la formación de
lesiones precursoras



VIH principal factor
de riesgo




Hombres que tienen sexo con
hombres principal población de
control



Cribado poblacional
principal herramienta de
control

La similitud existente entre el ca. De cérvix y el ca de ano (tanto desde un punto de vista Histopatológico como por su relación con el VPH), hizo que los precursores de la AAR, a mediados de la década de los 90, vieran en la metodología empleada para el estudio de ca de cérvix y de sus lesiones precursoras, una herramienta útil para el estudio del ca de ano y de las lesiones, que por aquel entonces aun sin evidencia suficiente, se pensaba que podían ser sus precursoras.

ESTRATEGIA





Detectar a la población con factores de riesgo para el desarrollo de lesiones precursoras o con antecedentes que limiten la capacidad de respuesta de su propio organismo ante el VPH y sus lesiones

Evaluar su situación: presencia de VPH y existencia de AIN mediante AAR

Aplicar medidas para erradicar el VPH y tratar las lesiones diagnosticadas en la AAR

ALGORITMO





CONCLUSIONES

